

PRŮVODCE OSVĚDČENÝM POSTUPEM LÉČBY DIGITÁLNÍ DERMATITIDY

1

DODRŽUJETE JEDNO PRAVIDLO?

Zvednutí nohy krávy pro ošetření digitální dermatitidy by mělo být rychlé a snadno proveditelné.

Vše by mělo trvat: 1 minutu 1 pracovníkovi ošetřit 1 krávu

To je proveditelné, jestliže budete mít vždy k dispozici vhodnou fixační klec pro úpravu paznehtů, která bude umístěna na snadno dostupném místě. Nastavte tuto prioritu.



1. UMÍSTĚTE KRÁVU DO FIXAČNÍ KLECE A ZVEDNĚTE JÍ NOHU. OČISTĚTE PŘEBYTEČNÉ NEČISTOTY.



2. PRO DŮKLADNÉ VYČIŠTĚNÍ EXSUDÁTU Z LÉZE POUŽIJTE VATU.



3. PŘED APLIKACÍ ANTIBIOTICKÉHO SPREJE BY MĚLA BÝT LÉZE ČERVENÁ A ČERSTVÉHO VZHLEDU.



4. LÉZI OŠETŘETE POMOCÍ REGISTROVANÉHO PRODUKTU, JAKO JE TETRACYKLINOVÝ (MODRÝ) AEROSOL.



5. PŘED SPUŠTĚNÍM NOHY NA PODLOŽKU NECHTE SPREJ ZASCHNOUT. PŘÍPADNĚ, SPREJ RE-APLIKUJTE DLE POKYŇŮ VÝROBCE.



6. TĚŽKÉ, RECIDIVUJÍCÍ NEBO CHRONICKÉ PŘÍPADY MOHOU VYŽADOVAT SOUBĚŽNÉ SYSTÉMOVÉ (INJEKČNÍ) PODÁNÍ ANTIBIOTIK.



7. ÚSPĚŠNÁ LÉČBA BY MĚLA VYÚSTIT PŘIBLIŽNĚ PO 10 DNECH. KŮŽE BY MĚLA BÝT ZCELA VYLÉČENÁ A NEBOLESTIVÁ.



CYCLOSPRAY 78,6 mg/g kožní sprej, suspenze pro prasata, ovce a skoty.
Složení Léčivá látka: chlortetracyklin hydrochlorid 78,6 mg/g. Pomocné látky: patentní modř V, barvivo 4,8 mg/g. **Cílové druhy zvířat** Skot, ovce a prasata. **Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat** Podpurná léčba infekcí superficiálního traumatického původu nebo chirurgických ran způsobených mikroorganismy citlivými na chlortetracyklin. Přípravek lze použít jako součást léčby superficiálních infekcí kopyt, zvláště interdigitální dermatitidy (kulhavka) u ovcí a digitální dermatitidy u skotu. **Kontraindikace** Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek. **Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)** Vzácně se mohou objevit hypersenzitivní reakce. **Podávané množství a způsob podání** Veterinární léčivý přípravek je indikován ke kožnímu podání. Před nastříkáním důkladně obal protřepajte. Držte obal ve vzdálenosti 15-20 cm od ošetřované oblasti a stříkejte přípravek přibližně po dobu 3 sekund (odpovídá přibližně 3,9 g přípravku neboli 0,10 g chlortetracyklinu), dokud se ošetřovaná oblast rovnoměrně nezbarví. V případě infekce kopyt je nutné zopakovat nástřik po uplynutí 30 sekund. V případě podpurné léčby infekcí superficiálního traumatického původu nebo chirurgických ran se doporučuje jednorázové podání. Při léčbě digitální dermatitidy se doporučuje podání dvou nástřiků (v intervalu 30 sekund) denně po dobu tří po sobě jdoucích dnů. Při léčbě jiných infekcí kopyt (kulhavka) se doporučuje podání dvou nástřiků (v intervalu 30 sekund). Podle závažnosti poškození a rychlosti zlepšení by se měla léčba opakovat po dobu 1 až 3 dnů. **Ochranné lhůty** Mléko: Bez ochranných lhůt. Mléko: Bez ochranných lhůt. Nepoužívat pro ošetření vemene u laktujících zvířat, pokud je jejich mléko určeno pro lidskou spotřebu. **Držitel rozhodnutí o registraci** Eurovet Animal Health BV, Handelsweg 25, 5531 AE Biadé, Nizozemsko. **Registrční číslo(a)** 96069/16-C. **Velikost balení:** 270 ml (130,76 g), 500 ml (251,52 g). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.